

එළවළු බෝග සඳහා පොහොර නිර්දේශ

පහතරට එළවළු

වට්ටක්කා

කල්පිටිය හැර සෙසු ප්‍රදේශය සඳහා

ආකාරය	යොදන වේලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
හුණු යෙදීම	සිටුවීමට සති 02 පෙර	අළුහුණු / ඩොලමයිට්	1 - 2 ටොන් / හෙක්
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ / හෙක්.		
යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා කි.ග්‍රෑ / හෙක්.	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි. ග්‍රෑ / හෙක්.	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි. ග්‍රෑ / හෙක්.
මූලික පොහොර	75	195	60
පැළ මතු වී සති 2 පසු	75	-	60
පැළ මතු වී සති 5 පසු	75	-	60

- PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය

කල්පිටිය ප්‍රදේශය සඳහා

ආකාරය	යොදන වේලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ / හෙක්.		
යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා කි.ග්‍රෑ / හෙක්.	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි. ග්‍රෑ / හෙක්.	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි. ග්‍රෑ / හෙක්.
මූලික පොහොර	45	195	35
පැළ මතු වී දින 10 පසු	45	-	35
පැළ මතු වී දින 20 පසු	45	-	35
පැළ මතු වී දින 30 පසු	45	-	35
පැළ මතු වී දින 40 පසු	45	-	35
පැළ මතු වී දින 50 පසු	45	-	35

දඹල

ආකාරය	යොදන වේලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
හුණු යෙදීම	සිටුවීමට සති 02 පෙර	අළුහුණු / ඩොලමයිට්	1 - 2 ටොන් / හෙක්
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම් පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ / හෙක්.		
යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.
මූලික පොහොර සිටුවීමට දින 2කට පෙර)	45	215	65
පැළ මතු වී සති 4	20	-	-
පැළ මතු වී සති 10	20	-	-

- PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය

බණ්ඩක්කා

ආකාරය	යොදන වේලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
හුණු යෙදීම	සිටුවීමට සති 02 පෙර	අළුහුණු / ඩොලමයිට්	1 - 2 ටොන් / හෙක්
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම් පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ / හෙක්.		
යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා කි.ග්‍රෑ/හෙ.	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි. ග්‍රෑ/හෙ.	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි. ග්‍රෑ/හෙ.
මූලික පොහොර	50	195	25
සිටුවා සති 2	50	-	25
සිටුවා සති 5	100	-	50
සිටුවා සති 8	100	-	50

- PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය

පිපිඤ්ඤා

කල්පිටිය හැර සෙසු ප්‍රදේශය සඳහා

ආකාරය	යොදන වේලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
හුණු යෙදීම	සිටුවීමට සති 02 පෙර	අළුහුණු / ඩොලමයිට්	1 - 2 ටොන් / හෙක්
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ / හෙක්.		
යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා කි.ග්‍රෑ / හෙක්.	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි.ග්‍රෑ / හෙක්.	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ / හෙක්.
මූලික පොහොර	75	195	60
පැළ මතු වී සති 2 පසු	75	-	60
පැළ මතු වී සති 5 පසු	75		60

- PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය

කල්පිටිය ප්‍රදේශය සඳහා

ආකාරය	යොදන වේලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ / හෙක්.		
යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා කි.ග්‍රෑ / හෙක්.	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි. ග්‍රෑ / හෙක්.	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි. ග්‍රෑ / හෙක්.
මූලික පොහොර	45	195	35
පැළ මතු වී දින 10 පසු	45	-	35
පැළ මතු වී දින 20 පසු	45	-	35
පැළ මතු වී දින 30 පසු	45	-	35
පැළ මතු වී දින 40 පසු	45	-	35
පැළ මතු වී දින 50 පසු	45	-	35

- PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය

වම්බු

ආකාරය	යොදන වේලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
හුණු යෙදීම	සිටුවීමට සති 02 පෙර	අළුහුණු / ඩොලමයිට්	1 - 2 ටොන් / හෙක්
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.		
යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා කි.ග්‍රෑ./ හෙක්.	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි.ග්‍රෑ./හෙක්.	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ./හෙක්.
මූලික පොහොර පැළ සිටුවීමට පෙර	75	325	85
මතුපිට පොහොර පැළ සිටුවා සති 4 දී	75	-	-
පැළ සිටුවා සති 8 දී	75	-	85
පැළ සිටුවා සති 12 දී	75	-	-

- $PH < 5$ නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය

පතෝල

කරවිල

වැටකොළ

කල්පිටිය හැර සෙසු ප්‍රදේශ සඳහා

ආකාරය	යොදන වේලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
හුණු යෙදීම	සිටුවීමට සති 02 පෙර	අළුහුණු / ඩොලමයිට්	1 - 2 ටොන් / හෙක්
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.		
යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි.ග්‍රෑ / හෙක්.	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.
මූලික පොහොර	75	195	60
පැළ මතුපිට සති 4	75	-	60
පැළ මතුපිට සති 8	75	-	60

- $PH < 5$ නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය

පකෝල
කරවිල
වැටකොළ

කල්පිටිය ප්‍රදේශය සඳහා

ආකාරය	යොදන වෙලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.		
යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි.ග්‍රෑ / හෙක්.	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.
මූලික පොහොර	35	195	25
සිටුවා දින 15 න්	35	-	25
සිටුවා දින 30 න්	35		25
සිටුවා දින 45 න්	35		25
සිටුවා දින 60 න්	35		25
සිටුවා දින 75 න්	35		25
සිටුවා දින 90 න්	35		25

PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය

කොහිල

යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා කි.ග්‍රෑ/ වර්ග මීටර් 100 ට	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි.ග්‍රෑ/ වර්ග මීටර් 100 ට	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ /වර්ග මීටර් 100 ට
පැල සිටුවීමට පෙර	01	1 1/2	01
සිටුවා සති 4 දී	01	-	-
සෑම මාස 6කට වරක්	-	01	-
සෑම අස්වැන්න නෙලීමකින් පසු	1/2	-	1/2

**නිවිති
තම්පලා**

ආකාරය	යොදන වේලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
හුණු යෙදීම	සිටුවීමට සති 02 පෙර	අළුහුණු / ඩොලමයිට්	1 - 2 ටොන් / හෙක්
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.		
යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.
පැල සිටුවීමට පෙර	85	130	100
සිටුවා සති 4ට පසු	85	-	-

- PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය

**කංකුන්
ගොටුකොළ
මුකුණුවැන්න**

ආකාරය	යොදන වේලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
හුණු යෙදීම	සිටුවීමට සති 02 පෙර	අළුහුණු / ඩොලමයිට්	1 - 2 ටොන් / හෙක්
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
	සෑම මාස 6කට වරක්		10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.		
යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.
පැල සිටුවීමට පෙර	85	130	100
සිටුවා සති 4ට පසු	85	-	-
අස්වැන්න නෙළීමෙන් පසු	-	45	-
සෑම මාස 06ට වරක්	-	65	-

- PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය

සාරණ

යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා කි.ග්‍රෑ/ වර්ග මීටර් 100 ට	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි.ග්‍රෑ/ වර්ග මීටර් 100 ට	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ /වර්ග මීටර් 100 ට
බීජ වැපිරීමට පෙර	01	1 1/2	01

මෑ කරල්

ආකාරය	යොදන වේලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
හුණු යෙදීම	සිටුවීමට සති 02 පෙර	අළුහුණු / ඩොලමයිට්	1 - 2 ටොන් / හෙක්
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.		
යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි. ග්‍රෑ/ හෙක්.	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි. ග්‍රෑ/ හෙක්.
මූලික පොහොර (සිටුවීමට දින 2කට පෙර)	35	130	35
සිටුවා මාසයකට පසු	55	-	35

- PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය

එළබටු

යොදන අවස්ථාව	යූරියා	ත්‍රිපල් සුපර් පොස්පේට්	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්
මූලික පොහොර	75	325	80-85
මතුපිට පොහොර			
සිටුවා මාස 01 පසු	75	-	-
සිටුවා මාස 02 පසු	75	-	85
සිටුවා මාස 03 පසු	75	-	-

තිත්බටු

ආකාරය	යොදන වේලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
හුණු යෙදීම	සිටුවීමට සති 02 පෙර	අළුහුණු / ඩොලමයිට්	1 - 2 ටොන් / හෙක්
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
	සිටුවා මාස 06		05 ටොන් / හෙක්
	සිටුවා මාස 12		05 ටොන් / හෙක්
	සිටුවා මාස 18		05 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.		
යෙදීමේ අවස්ථාව	යූරියා	ත්‍රිත්ව සුපර් ෆොස්පේට්	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්
සිටුවන විට	75	320	85
සිටුවා සති 4, 8 හා 12	35	-	-
මාසයකින් පසු මාස 2කට වරක්	30	-	40

- PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය

කැකිරි

යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.
මූලික පොහොර	75	200	60
පැළ මතු වී සති 2 පසු	75	-	60
පැළ මතු වී සති 05 පසු	75	-	60

තුඹකරවිල

ආකාරය	යොදන වේලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
හුණු යෙදීම	සිටුවීමට සති 02 පෙර	අළුහුණු / ඩොලමයිට්	1 - 2 ටොන් / හෙක්
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
	සිටුවා සති 10න්		05 ටොන් / හෙක්
	සිටුවා සති 22න්		05 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.		
යෙදීමේ අවස්ථාව	යූරියා	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට්	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්
සිටුවන විට	75	195	65
සිටුවා සති 03න්	75	-	65
සිටුවා සති 06න්	75	-	65
සිටුවා සති 10න්	75	-	65
සිටුවා සති 14න්	75	100	65
සිටුවා සති 18න්	75	-	65
සිටුවා සති 22න්	75	-	65
සිටුවා සති 26න්	75	-	65
සිටුවා සති 30න්	75	-	65

- PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය

උඩරට එළවළු

රාඹ

ආකාරය	යොදන වේලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
හුණු යෙදීම	සිටුවීමට සති 02 පෙර	අළුහුණු / ඩොලමයිට්	1 - 2 ටොන් / හෙක්
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.		
යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.
මූලික පොහොර (සිටුවීමට දින 2කට පෙර)	85	110	65
සති 3 දී	85	-	65

- PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය

ලීක්ස්

ආකාරය	යොදන වේලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
හුණු යෙදීම	සිටුවීමට සති 02 පෙර	අළුහුණු / ඩොලමයිට්	1 - 2 ටොන් / හෙක්
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.		
යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි. ග්‍රෑ/ හෙක්.	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි. ග්‍රෑ/හෙක්.
මූලික පොහොර	85	270	50
පැළ වී මාස 01 ට පසු	85	-	-
පැළ වී මාස 02 ට පසු	85	-	50
පැළ වී මාස 03 ට පසු	85	-	-
පැළ වී මාස 04 ට පසු	85	-	50

- PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය

තක්කාලි

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය හැර සෙසු ප්‍රදේශ සඳහා

ආකාරය	යොදන වෙලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
හුණු යෙදීම	සිටුවීමට සති 02 පෙර	අළුහුණු / ඩොලමයිට්	1 - 2 ටොන් / හෙක්
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.		
යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි. ග්‍රෑ/ හෙක්.	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.
මූලික පොහොර (පැළ සිටුවීමට දින 1-2 කට පෙර)	65	325	65
පැළ සිටුවා සති 3 පසු	65	-	-
පැළ සිටුවා සති 6 පසු	65	-	65

- PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය සඳහා

ආකාරය	යොදන වෙලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
හුණු යෙදීම	සිටුවීමට සති 02 පෙර	අළුහුණු / ඩොලමයිට්	1 - 2 ටොන් / හෙක්
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.		
යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි. ග්‍රෑ/ හෙක්.	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.
මූලික පොහොර (පැළ සිටුවීමට දින 1-2 කට පෙර)	65	215	50
පැළ සිටුවා සති 3 පසු	65	-	-
පැළ සිටුවා සති 6 පසු	65	-	50

- PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය

බෝවී

වැල් බෝවී

ආකාරය	යොදන වේලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
හුණු යෙදීම	සිටුවීමට සති 02 පෙර	අළුහුණු / ඩොලමයිට්	1 - 2 ටොන් / හෙක්
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.		
යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.
මූලික පොහොර (සිටුවීමට දින 2 කට පෙර)	110	270	75
පැළ මතු වී සති 3 දී	110	-	75

- PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය

පඳුරු බෝවී

ආකාරය	යොදන වේලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
හුණු යෙදීම	සිටුවීමට සති 02 පෙර	අළුහුණු / ඩොලමයිට්	1 - 2 ටොන් / හෙක්
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.		
යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.
මූලික පොහොර	85	165	65
පැළ මතු වී සති 3 දී	85	-	65

- PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය

බිටරුව

ආකාරය	යොදන වේලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
හුණු යෙදීම	සිටුවීමට සති 02 පෙර	අළුහුණු / ඩොලමයිට්	1 - 2 ටොන් / හෙක්
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම් පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.		
යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි.ග්‍රෑ/හෙක්.	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.
මූලික පොහොර	165	270	125
සිටුවා සති 4 කට පසු	165	-	125

- PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය

මාළුමිරිස්

ආකාරය	යොදන වේලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
හුණු යෙදීම	සිටුවීමට සති 02 පෙර	අළුහුණු / ඩොලමයිට්	1 - 2 ටොන් / හෙක්
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම් පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.		
යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.
මූලික පොහොර සිටුවීමට දින 2ට පෙර)	100	215	65
සිටුවා මාස 01 ට පසු	100	-	65
සිටුවා මාස 02 ට පසු	100	-	65

- PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය

කැරට්

ආකාරය	යොදන වේලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
හුණු යෙදීම	සිටුවීමට සති 02 පෙර	අළුහුණු / ඩොලමයිට්	1 - 2 ටොන් / හෙක්
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.		
යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි. ග්‍රෑ/ හෙක්.	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ/හෙක්.
මූලික පොහොර	-	270	-
සති 3 දී	110	-	85
සති 6 දී	110	-	85
සති 9 දී	110	-	85

- PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය

ගෝවා

මල් ගෝවා

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය සඳහා

ආකාරය	යොදන වේලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
හුණු යෙදීම	සිටුවීමට සති 02 පෙර	අළුහුණු / ඩොලමයිට්	1 - 2 ටොන් / හෙක්
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.		
යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා කි.ග්‍රෑ/ හෙක්	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි. ග්‍රෑ/ හෙක්	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්
මූලික පොහොර	-	270	75
සති 2 දී	110	-	-
සති 5 දී	110	-	75
සති 8 දී	110	-	-

- PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය

නුවරඑළිය හැර සෙසු ප්‍රදේශ සඳහා

ආකාරය	යොදන වේලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
හුණු යෙදීම	සිටුවීමට සති 02 පෙර	අළුහුණු / ඩොලමයිට්	1 - 2 ටොන් / හෙක්
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ / හෙක්.		
යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා කි.ග්‍රෑ/ හෙක්	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි. ග්‍රෑ/ හෙක්	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්
මූලික පොහොර	110	270	75
සති 3 දී	110	-	-
සති 6 දී	110	-	75

- PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය

සලාද

වර්ගය	යොදන අවස්ථාව	ප්‍රභවය	ප්‍රමාණය (ටොන්/ හෙක්.)	
හුණු	පැළ සිටුවීමට සති 2 කට පෙර	හුණු/ ඩොලමයිට්	1-2	
කාබනික පොහොර	පැළ සිටුවීමට දින 3-5ට පෙර	කුකුල් පොහොර/ ගොම පොහොර/ කොම්පෝස්ට්	10	
වර්ගය	යොදන අවස්ථාව	යූරියා කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	ටී.එස්.පී. කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	එම්.ඕ.පී. කි.ග්‍රෑ/හෙක්.
රසායනික පොහොර	සිටුවීමට පෙර	215	130	75

- PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය.

නෝකෝල්

ආකාරය	යොදන වේලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
හුණු යෙදීම	සිටුවීමට සති 02 පෙර	අළුහුණු / ඩොලමයිට්	1 - 2 ටොන් / හෙක්
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.		
යෙදිය යුතු කාලය	යුරියා කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි. ග්‍රෑ/ හෙක්.	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි. ග්‍රෑ/ හෙක්.
මූලික පොහොර (සිටුවීමට දින 2කට පෙර)	85	110	65
සිටුවා සති 03කට පසු	85	-	65

- PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය