

24ල වැක්කන්

විශේෂ ලක්ෂණ

- පත්‍ර වලින් යුෂ උරා බීම නිසා පත්‍ර වල සුදු පාට පැල්ලම් ඇතිවේ
- අංකුර මැටියාවේ වසිරිස් රෝගයේ වාහකයා ලෙස ක්‍රියා කරයි



24ල වැක්කන්



හානිය

වේයන්



වේයන්

හානිය

කඳු හා මුල පද්ධතියට ඇතුළු වී හානි කරයි. කරල් වල සිදුරු සාදා බීජ කා දමයි.



හානිය

කන්‍යා (Anisolabis stali)



32ලැබීම

බීජබර්

හානිය

ශිශුවන් සහ සුනඹුලන් ලපටි කරල් වලට හානි කර බීජ කා දමයි. හානි කල කරල් වලට ද්විතියිකව දැලිට ආසාදනය වේ.



හානිය

තල වඟාවේ ජලිතෝධ

24තු දැල් බදුන්තා (Antigastrea catalaunalis)

විශේෂ ලක්ෂණ

- සුනඹුල තැඹිලි පැහැයට හුරු දුඹුරු පැහැති සැලබෙයෙකි
- ලපටි කිරිපිත් සුදු පැහැතිය. වැඩුණු කිරිපිත් කොළ පැහැති වන අතර කළු ලප සහිතය

හානිය

- ගාකයේ වර්ධක ස්ථානයේ පත්‍ර එකතු කර දැලක් බද්දි
- මල් හා අංකුර වල කිරිපිත් විසින් හානිකරන ලද සිදුරු දැකිය හැකිය

24ලතාය

ඇසිජෙටි 75% එස්.පී. 1 කි.ග්‍රෑ/හෙක්.

විමසීම් : අධ්‍යයන

සෞඛ්‍ය සේවා දිස්ත්‍රික්ක හා සංවර්ධන අරායතාය
 විනාශකාරීවලට මේ
 දුරකථන අංකය : 035-2249177
 035-2249172

අපි වචමු ඊට නැමුමු

දේශීය ආහාර නිෂ්පාදනය දිරි ගැන්වීමේ ජාතික මෙහෙයුම් 2007-2010

කොල්

කෝහවල

ජලිතෝධ



ඊට කපු වගාවේ අලිබෝධ

ඊතු කේශඵ දළඹුවා (*Amsacta albistriga*)

විශේෂ ලක්ෂණ

- දුම්රු පැහැයට හුරු සුදු පාට සලබයෙකි පියාපත් දිගහැරිය විට මි.මි. 40-50ක් පමණ විශාලය
- ලෙට් කිරිසින් ම දුම්රු පාට වන අතර, සම්පූර්ණයෙන් වැඩුණු විට ඊතු පැහැයක් ගනී



කීටයා



පුඤ්චල

හානිය

කිරිසින් විසින් පත්‍ර ආහාරයට ගනී

පාලනය

- දළඹුවන් හා බීත්තර එකතුකර විනාශ කිරීම
- ඊතයනික පාලනය සඳහා කාබෝසල්ෆාන් කෘමිනාශකය භාවිතය

පත්‍ර කන දළඹුවන්

(*Spodoptera litura*)

විශේෂ ලක්ෂණ

- සුනඹුලා දුම්රු පාටය. බීත්තර සමූහ වශයෙන් පත්‍ර මත දැමයි
- ලෙට් කිරිසින් ම කොළ පාට වන අතර පසුව අදුරු කොළ පැහැයට හැරේ



බීත්තර



කීටයා



පුඤ්චල

හානිය

ලෙට් කිරිසින් විසින් පත්‍ර සුටා කයි. වැඩුණු කිරිසින් විසින් කරල් වලට හානි සිදුකරයි

කුෂිඊතන්

(*Aphis craccivora*)

විශේෂ ලක්ෂණ

මි.මි. 1-2 ක් පමණ දිග කළු පැහැති සතෙකි

හානිය

- ගහයේ පත්‍ර හා කඳ ප්‍රදේශයන් යුෂ උරා බීම නිසා විකෘති පත්‍ර හා කඳන් සහිත කුරු ගහ අරති වේ
- වසිරිස් රෝග පතුරුවා හරින වාහකයින් ලෙසද ක්‍රියා කරයි



හානිය

පත්‍ර කනිඊතන් (*Stompteryx subsecivella*)

විශේෂ ලක්ෂණ

සුනඹුලා මි.මි. 6 ක් පමණ දිග දුම්රු අළු පැහැති සලබයෙකි



පුඤ්චල

හානිය

කුඩා කිරිසින් පත්‍රයේ උමං භාරයි. නානිය වැඩි වූ විට පත්‍ර පිළිස්සුණු ස්වභාවයක් ගනී



හානිය