

අලු බෝග සඳහා පොහොර නිර්දේශ

මඤ්ඤොක්කා

ආකාරය	යොදන වේලාව	වර්ගය			ප්‍රමාණය
හුණු යෙදීම	සිටුවීමට සති 02 පෙර	අළුහුණු / ඩොලමයිට්			1 - 2 ටොන් / හෙක්
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර			10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර		වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.			
		Urea	TSP	MOP	
	සිටුවීමට පෙර	-	120	-	
	සිටුවා සති 02	85	-	125	
	සිටුවා සති 10 - 12	85	-	60	
	සිටුවා සති 16 - 18	85	-	60	

- PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය

බතල

ආකාරය	යොදන වේලාව	වර්ගය			ප්‍රමාණය
හුණු යෙදීම	සිටුවීමට සති 02 පෙර	අළුහුණු / ඩොලමයිට්			1 - 2 ටොන් / හෙක්
කාබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර			10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර		වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.			
		Urea	TSP	MOP	
	සිටුවීමට පෙර	-	-	-	
	සිටුවා සති 02 න්	65	120	115	
	සිටුවා සති 06 න්	65	-	60	

- PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය

ඉන්හල

ආකාරය	යොදන වේලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
හුණු යෙදීම	සිටුවීමට සති 02 පෙර	අළුහුණු / ඩොලමයිට්	1 - 2 ටොන් / හෙක්
කබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය සහ ප්‍රමාණය කිලෝ/ හෙක්.		
		යූරියා	TSP
සිටුවීමට පෙර		-	150
සිටුවීමෙන් සති 2 පසු		65	-
සිටුවීමෙන් සති 6-8 පසු		65	-
සිටුවීමෙන් සති 10-12 පසු		-	60

- PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය

කිරිඳල

ආකාරය	යොදන වේලාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
හුණු යෙදීම	සිටුවීමට සති 02 පෙර	අළුහුණු / ඩොලමයිට්	1 - 2 ටොන් / හෙක්
කබනික පොහොර යෙදීම	සිටුවීමට දින 3-5 පෙර	කුකුල් පොහොර / ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර	10 ටොන් / හෙක්
රසායනික පොහොර	වර්ගය/ප්‍රමාණය කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.		
යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.	මිශුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.
පැල සිටුවීමට පෙර	35	120	60
සිටුවා මාස 1- 2 දී	65	-	60
සිටුවා මාස 3- 4 දී	65	-	60
සිටුවා මාස 5 දී	-	-	40
සිටුවා මාස 6 දී	-	-	40

- PH < 5 නම් පමණක් හුණු යෙදිය යුතුය